

Student som leder samtalet

Typfall: Seppo 70 år-ögat rinner

Termin: Termin 9 Läkarprogrammet

Tema: Sinne-ögon/ÖNH

Ansvarig för fallet: Birgitta Ejderik Lindblad/ Susanna Sagerfors/Amanj Saber/Per-Inge Carlsson

Ingress:

Seppo 70 år är på blodtryckskontroll hos dig som läkare vårdcentralen. Han nämner att han sedan en tid tillbaka är torr och irriterad på huden under höger öga. Ögat rinner lite mera på den sidan och hans dotter och barnbarn som han inte träffat honom på länge tycker att han ser annorlunda ut i ansiktet.



Fallet del 1

Du kompletterar anamnesen kring patientens besvär, och funderar på status och vidare handläggning

Fallet del 2

Patienten bor ensam på landet. Han är pensionär sedan några år och spenderar sin fritid med fågelskådning och bärplockning, men sista tiden har orken minskat och han håller sig mest hemma.

Tidsaspekt: Besvären har utvecklats under de senaste 4 veckorna. Han har inte ont i ögat eller ansiktet men huden under ögat är fnasig och det irriterar när han måste torka undan tårarna som rinner mer på denna sida.

Status: Bägge ögon är oretade. Höger ögas nedre ögonlock är lite slapt och hänger. När patient blinkar så ses tydlig skillnad mellan höger och vänster öga.

Du ber därför patienten att blunda och ser då att höger öga inte helt stängs utan 2-3 mm av ögonvitan syns.

Du känner rutinmässig efter körtlar på halsen utan säkra patologiska fynd, men svårbedömt pga att patienten har tjockt skägg, möjligen finns en konsistensökning på höger kind. Övrigt ÖNH status u a.

Du tänker på olika orsaker till patientens besvär och funderar på vidare utredning.

Fallet del 3

Borreliaserologi negativ

Hb 117, SR 45, CRP 60, LPK 8,1, TPK 210. BT 120/80.

En vecka efter besöket får du ovanstående provsvar. Du ringer patienten och meddelar provsvaren. Patienten berättar då att han nu knappt kan stänga höger öga alls och ögat börjar kännas irriterat och det är lätt rodnad. Det är svårt att dricka, det rinner ur höger mungipa.

Du funderar över tänkbara diagnoser och lämplig behandling och överväger att remittera patienten.